



Grupo 1 ESQ: Esquizofrenia

Número de sujetos 9, 8 varones y 1 mujer

Rango de edad 18 a 24 años

Diagnóstico Este ha sido establecido de acuerdo a los seis criterios diagnósticos del DSM IV. Presentan síntomas positivos y negativos de la enfermedad. En la evaluación neuropsicológica presentan disminución funcional especialmente a nivel de procesos ejecutivos y de adaptación socio-afectiva.

Actividad académica o laboral Todos ellos han interrumpido su actividad educacional o laboral y han iniciado el entrenamiento computacional después de tres a seis meses de comenzar el tratamiento psiquiátrico.

Rendimiento El nivel intelectual medio del grupo alcanza el rango promedio o levemente inferior al promedio normal en la escala de WAIS. No logran rendimiento promedio en los ejercicios que involucran manejo del tiempo, organización, iniciativa ni en la continuidad de la acción orientada a una meta. También se observa déficit, en atención dividida, así como, en memoria de trabajo y en memoria verbal. Rinden mejor en lenguaje comprensivo que en lenguaje expresivo, aunque en ambos aspectos por debajo del nivel normativo normal.

Fármacos Su ritmo general se observa lentificado. Todos ellos se encuentran en tratamiento con fármacos antipsicóticos atípicos como: Olanzapina, Clozapina, Risperidona, Haloperidol y/o antidepresivos como Paroxetina, Venlafaxina, Lamotrigina y Sertralina.

Grupo 1 ESQ

Relación entre rendimiento y periodos de tratamiento

